

TÌM HIỂU VỀ NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA

Periostat

(doxycycline hyclate) những viên thuốc nặng 20mg

Periostat là một vũ khí hiệu quả trong việc chống lại bệnh lợi trầm trọng (adult periodontitis—bệnh viêm nha chu ở người lớn). Thuốc này trực tiếp chặn đứng sự hủy hoại bởi những một số loại en-zim nhất định trong cơ thể của bạn quý vị đối với răng và mô lợi. Periostat là loại thuốc duy nhất và đầu tiên có tác dụng chủ yếu dùng để chặn đứng sự hủy hoại của những loại en-zim này. Periostat chỉ được cấp theo toa bác sĩ. Tốt nhất thì nên và dùng dùng thuốc này bằng đường miệng cộng với thủ thuật cạo kỹ răng hay còn được hiểu gọi là lấy cao răng và cạo chân răng.

Sau đây là thông tin quan trọng về Periostat. Hãy cất giữ ở nơi dễ lấy để tiện tham khảo.

Hỏi và Đáp về Periostat

H: Periostat có tác dụng như thế nào?

Đ: Periostat có tác dụng chặn đứng một số loại en-zim được cơ thể tiết ra quá độ mà có thể làm tiêu hủy mô và xương của lợi.

H: Tại sao tôi phải nên dùng thuốc Periostat?

Đ: Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng phương pháp hiệu nghiệm nhất để chữa trị bệnh viêm nha chu là tiêu diệt các vi khuẩn gây nhiễm ở răng của quý vị bằng một thủ thuật cạo kỹ răng được gọi là lấy cao răng và cạo chân răng **cộng** với việc uống Periostat để kiềm chế các en-zim được tiết ra quá độ. Do đó, Periostat cải thiện độ ảnh hưởng của việc lấy cao răng và cạo chân răng bằng cách tạo điều kiện cho cơ thể sửa chữa và tái tạo các mô bị hỏng.

H: Khi nào tôi nên dùng thuốc Periostat?

Đ: Periostat nên được dùng mỗi ngày hai lần, thông thường một viên cho buổi sáng và một viên cho buổi tối. Nếu thời gian dùng thuốc gần với các bữa ăn, nên chừa khoảng cách thời gian là một tiếng trước khi ăn hoặc hai tiếng sau khi ăn. Thuốc Periostat nên được dùng chung với một lượng nước vừa đủ.

H: Tôi nên dùng Periostat trong khoảng thời gian là bao lâu?

Đ: Thời gian điều trị bằng Periostat là mau hay chậm tùy theo từng người một. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng khoảng thời gian điều trị tối thiểu để thấy được kết quả là 3 tháng. Điều cần nhớ rằng quý vị phải tiếp tục dùng thuốc Periostat theo sự hướng dẫn của nha sĩ. Xin xem mặt sau để biết thêm chi tiết.

H: Nếu tôi quên một lần dùng thuốc thì sau?

Đ: Cứ tiếp tục dùng thuốc vào lần kế tiếp. Đừng dùng gấp đôi để bù lại cho lần bị quên.

H: Tôi có thể dùng Periostat với các loại vi-ta-min hoặc thuốc khác không?

Đ: Periostat và một số loại thuốc nhất định khác có thể không hợp khi được dùng chung. Thuốc chống ợ chua và vi-ta-min có chứa chất khoáng thì không được dùng chung với thuốc Periostat. Xem mặt sau để biết thêm chi tiết.

H: Có ai không nên dùng Periostat không?

Đ: Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú bằng sữa mẹ thì không nên dùng Periostat, bởi vì thuốc này có thể gây hại cho thai nhi hoặc trẻ sơ sinh. Và, không nên dùng Periostat nếu quý vị bị dị ứng với thuốc kháng sinh loại tetracycline. Trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 8 tuổi thì không nên dùng Periostat.

Quý vị sắp sửa có được một bộ răng hàm khỏe mạnh hơn! Nên nhớ rằng—cần phải làm theo lời dặn của nha sĩ về việc tự chăm sóc tại nhà và giữ đúng các cuộc hẹn đến phòng nha sau này! Xin hãy tham vấn với nha sĩ hoặc chuyên viên vệ sinh răng của quý vị nếu có thắc mắc nào về chương trình điều trị của mình. Để biết thêm chi tiết về Periostat, xin mời quý vị xem trang Web của chúng tôi tại www.periostat.com.

BỆNH LỢI RĂNG PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO?



Bệnh viêm lợi

Vi khuẩn và bợn răng làm cho lợi bị viêm và dễ chảy máu. Bợn răng đóng ở khoảng giữa răng và lợi. Cạo răng tại phòng nha sĩ và tự chăm sóc tại nhà thông thường cũng đủ để lợi được hồi phục.



Bệnh viêm nha chu

Có nhiều vi khuẩn được sinh sản làm cho cơ thể tiết ra các en-zim hủy hoại mô. Những en-zim này bắt đầu một tiến trình dẫn đến hậu quả là có các "túi" quanh răng sâu hơn và bị mất xương răng. Sự điều trị bệnh này là nhắm vào việc chặn đứng sự hư hỏng hơn nữa và đảo ngược sự phát triển của căn bệnh.



Bệnh viêm nha chu ở giai đoạn trầm trọng

Vi khuẩn và en-zim đã làm cho lợi và xương răng thoái biến nặng hơn. Ở giai đoạn này, việc điều trị là hết sức cần thiết để tránh bị rụng.

Quý vị nên đọc thông tin này trước khi dùng PERIOSTAT®. Bản thông tin này chỉ tóm tắt một số thông tin nhất định về PERIOSTAT. Nha sĩ hoặc dược sĩ của quý vị có thể cho quý vị biết đầy đủ hơn các thông tin đã được viết riêng cho chuyên gia y tế. Bản thông tin này không nhằm thay thế cho việc quý vị cần bàn bạc kỹ với nha sĩ của mình trước khi dùng PERIOSTAT cũng như lúc đang khám răng định kỳ.

PERIOSTAT là gì?

PERIOSTAT là thuốc dùng cộng với thủ thuật cạo kỹ răng (còn được gọi là lấy cao răng và cạo chân răng) bởi nha sĩ.

PERIOSTAT cộng với sự lấy cao răng và cạo chân răng cải thiện sự vững chắc và sức khỏe của lợi và răng người lớn bị bệnh viêm nha chu (bệnh lợi).

PERIOSTAT có tác dụng làm giảm hoạt động của một số en-zim được tiết ra trong các mô lợi và xương quanh răng người lớn mắc bệnh lợi răng.

PERIOSTAT có dạng viên để quý vị dùng qua đường miệng mỗi ngày hai lần. Mỗi viên PERIOSTAT chứa doxycycline hyclate có lượng tương đương với 20mg doxycycline.

AI không nên dùng PERIOSTAT?

Không được dùng PERIOSTAT nếu quý vị

- bị dị ứng với bất cứ thuốc kháng sinh loại tetracycline nào, kể cả doxycycline và minocycline. Nếu quý vị không biết chắc về bất cứ những loại thuốc này, thì quý vị nên nói chuyện với nha sĩ hoặc dược sĩ của mình.
 - đang mang thai hoặc có ý định mang thai, vì thuốc này có thể làm hại đến thai nhi. Nếu quý vị đang nghi hoặc biết được rằng mình đã có thai trong khi đang dùng PERIOSTAT thì hãy ngưng dùng thuốc ngay tức khắc và liên lạc với nha sĩ hoặc bác sĩ của mình.
 - đang cho con bú sữa mẹ, vì thuốc này sẽ hoà vào sữa mẹ và có thể làm hại đến trẻ sơ sinh.
- PERIOSTAT không được cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em còn nhỏ dùng vì có thể vĩnh viễn làm biến màu răng hoặc ảnh hưởng không tốt đến việc phát triển của răng.

Tôi nên cho nha sĩ của tôi biết điều gì trước và trong khi điều trị bằng PERIOSTAT?

Cho nha sĩ biết nếu quý vị

- đã thường bị dị ứng với doxycycline hoặc những loại thuốc kháng sinh loại tetracycline khác.
- đang mang thai hoặc có ý định mang thai, vì PERIOSTAT có thể làm hại đến thai nhi.
- đang mắc bệnh thận hoặc gan.
- đã hoặc đang bị nhiễm men hoặc nấm ở miệng hoặc âm đạo.
- thường để da phơi nắng tự nhiên hay nắng nhân tạo, bởi vì da có thể bị cháy nắng trầm trọng hơn đối với một số người dùng doxycycline.
- đang dùng bất cứ các loại thuốc nào khác, kể cả các loại thuốc không cần toa (các sản phẩm được mua từ các kệ tạp hóa).

Cho nha sĩ biết nếu quý vị đang bị

- phát ban ngoài da, đỏ da, hoặc bị cháy nắng bất thường hay trầm trọng.
- bất cứ loại dị ứng nào, có thể bao gồm: chứng phát ban ngoài da, sưng tấy, cũng như nuốt khó hoặc có cảm giác bị nghẹt nơi cổ họng. Nếu bị bất cứ các triệu chứng này, quý vị nên liên lạc với nha sĩ hoặc bác sĩ của mình ngay tức khắc.
- bất cứ những phản ứng phụ khác có thể do thuốc này (xem danh sách các phản ứng phụ có thể xảy ra dưới đây).

Tôi nên dùng PERIOSTAT bằng cách nào?

PERIOSTAT nên được dùng hai lần một ngày bằng miệng, một viên cho buổi sáng và một viên cho buổi tối. Nếu thời gian dùng PERIOSTAT gần với các bữa ăn, nên chừa khoảng cách thời gian là một tiếng trước khi ăn hoặc hai tiếng sau khi ăn. PERIOSTAT nên được dùng chung với một ly nước đầy ở tư thế quý vị đang ngồi hoặc đứng để tránh bị khó chịu ở cổ họng. Quý vị không nên dùng nhiều hơn hoặc ít hơn liều PERIOSTAT hàng ngày đã được chỉ dẫn. Dùng nhiều hơn liều ấn định có thể làm tăng thêm phản ứng phụ. Quý vị nên tiếp tục dùng PERIOSTAT đến khi nào được nha sĩ cho phép ngưng thì mới thôi.

Tôi nên dùng PERIOSTAT trong thời gian bao lâu?

PERIOSTAT đã được chứng minh trong các cuộc nghiên cứu là có hiệu nghiệm khi được sử dụng liên tục trong khoảng thời gian là chín tháng. Thêm vào đó, PERIOSTAT đã được sử dụng một cách an toàn trong khoảng thời gian 12 tháng. Thời gian dùng PERIOSTAT khác nhau đối với từng người một và tùy thuộc vào mức độ trầm trọng của bệnh lợi và thời gian cần thiết để hồi phục cơ thể. Trong lúc đang khám, nha sĩ của quý vị sẽ xác định khi nào quý vị nên ngưng hoặc tiếp tục dùng PERIOSTAT dựa theo hiệu quả của sự điều trị cũng như mức độ cải thiện của bệnh lợi.

Tôi có thể dùng PERIOSTAT chung với các thứ thuốc khác không?

Việc dùng PERIOSTAT chung với một số thuốc nhất định khác có thể không mang lại sự công hiệu như mong muốn. Do đó, quý vị nên cho nha sĩ biết về các loại thuốc mà quý vị đang dùng hoặc có ý định dùng trong khi dùng PERIOSTAT. Nha sĩ của quý vị có thể cần tiếp xúc trực tiếp hoặc yêu cầu quý vị đến bác sĩ của quý vị.

- PERIOSTAT có thể có khả năng làm ảnh hưởng đến sự hiệu nghiệm của các phương pháp ngừa thai dùng bằng miệng, đưa đến việc mang thai.
- Nếu quý vị dùng thuốc chống ợ chua hoặc vi-ta-min có chất can-xi, nhôm, ma-giê, sắt, hoặc bismuth subsalicylate (thành phần hoạt tính của thuốc Pepto-Bismo®), hãy tránh dùng các loại thuốc này cùng lúc với PERIOSTAT, vì chúng có thể làm giảm độ hiệu nghiệm của PERIOSTAT.
- Nếu quý vị đang dùng thuốc làm loãng máu như Coumadin®, bác sĩ của quý vị có thể điều chỉnh lại liều lượng của thuốc này.
- PERIOSTAT có thể làm cho một số loại thuốc kháng sinh nhất định, trong đó có các loại thuốc penicillin, bị giảm mức hiệu nghiệm.
- Dùng các loại thuốc barbiturate như là phenobarbital, carbamazepine (Tegreto®), hoặc phenytoin (Dilantin®) có thể làm giảm thời gian hoạt động của PERIOSTAT trong cơ thể quý vị.
- Dùng PERIOSTAT chung với thuốc mê Penthrane® (methoxyflurane) có thể gây tác hại trầm trọng đến thận.

PERIOSTAT có thể gây ra những phản ứng phụ nào?

Trong các cuộc nghiên cứu, những người dùng PERIOSTAT báo cáo các phản ứng phụ hầu như giống nhau với những người dùng thuốc giả vờ (viên đường). Nhức đầu, cảm lạnh thông thường, và các triệu chứng cảm cúm là những phản ứng phụ được báo cáo nhiều nhất do những người dùng PERIOSTAT lẫn những người dùng thuốc giả vờ. Nôn mửa và khó chịu dạ dày cũng có thể xảy ra (các phản ứng phụ này có thể tránh được bằng cách dùng PERIOSTAT với một ly nước đầy).

Các phản ứng phụ sau đây không được báo cáo trong các cuộc nghiên cứu PERIOSTAT nhưng được báo cáo bởi những người dùng các loại thuốc tetracycline, kể cả doxycycline:

- **Chứng dạ dày-ruột non**—biếng ăn, nôn mửa, viêm lưỡi, khó nuốt, viêm mô (khi bị nhiễm men trong âm đạo) vùng hậu môn/bộ phận sinh dục. Gan có độc tính rất hiếm được báo cáo. Viêm hay loét ở thực quản rất hiếm được báo cáo đối với loại thuốc viên bao con nhộng (những loại phản ứng phụ này có thể tránh được bằng cách dùng PERIOSTAT với một ly nước đầy).
- **Da**—phát ban đỏ nổi cộm, phát ban trầm trọng có da bị lột (hiếm), chứng cảm quang (cháy nắng trầm trọng).
- **Các phản ứng phụ khác**—tăng lượng urê nitơ trong máu (BUN—một biểu hiện của chức năng thận), chứng tăng cảm (dị ứng có thể dẫn đến tử vong), tăng ban đỏ lupus toàn thân (đối với người đã bị chứng bệnh này), bị thiếu máu, và các chứng bất thường có liên quan đến máu.

Nếu quý vị gặp phải bất cứ phản ứng phụ nào được liệt kê ở trên hoặc có chứng bệnh nào mà quý vị nghĩ rằng có liên quan đến PERIOSTAT, thì cho nha sĩ hoặc bác sĩ của quý vị biết.

Những điều gì tôi nên biết thêm về PERIOSTAT?

Đây là bản thông tin tóm tắt về PERIOSTAT. Nếu có thắc mắc hoặc quan ngại nào về PERIOSTAT, quý vị nên đến trao đổi với nha sĩ của mình. Dược sĩ của quý vị có thể trao cho quý vị một tờ thông tin thêm dành riêng cho các chuyên gia y tế.

- Giữ PERIOSTAT xa khỏi tầm với của trẻ em.

Các thành phần không hoạt tính gồm có:

 hydroxypropyl methylcellulose, lactose, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, titanium dioxide, và triacetin.

PERIOSTAT là một thương hiệu có đăng ký của CollaGenex Pharmaceuticals, Inc., Newtown, PA 18940.

Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 4,666,897 và RE 34,656

©2001 CollaGenex Pharmaceuticals, Inc., Newtown, PA 18940 1841-00 (PPI) 04/01

